

	<i>FICHA TÉCNICA</i>		Revisión: 00 Aprobado: JN Fecha: 28-10-21 Página 1 de 2
			

Producto	:	STRACTA® ORTIGA+ HIGUERILLA	
Composición	:	Extracto de plantas	15.00 % p/v
	:	Quitosano	1.50 % p/v
Formulación	:	Concentrado Soluble (SL)	
Clase de uso	:	Inductor de defensa - fitofortificante	
Titular	:	SILVESTRE PERU S.A.C.	
Distribuidor	:	SILVESTRE PERU S.A.C.	

CARACTERÍSTICAS

STRACTA® ORTIGA + HIGUERILLA es un fitofortificante a base de diferentes Componentes Vegetales y Quitosano de origen natural, el cual, estimula las defensas de las plantas y la fortifica.

STRACTA® ORTIGA + HIGUERILLA produce un efecto fortificante a las paredes celulares de las plantas, reduciendo el estrés causado por enfermedades y plagas, permitiendo así, un mejor desarrollo vegetativo.

STRACTA® ORTIGA + HIGUERILLA posee un efecto sinergista con diferentes productos en el control de enfermedades y plagas.

CONSIDERACIONES PARA LA APLICACIÓN

- Aplicar el producto STRACTA® ORTIGA + HIGUERILLA en las primeras horas de la mañana o al atardecer.
- Realizar la aplicación cuando las condiciones ambientales (temperatura, humedad relativa, radiación, viento y precipitación) sean favorables.
- Usar equipo de protección personal durante la manipulación, mezcla y aplicación del producto.
- Asegurarse que la aplicación del producto sea uniforme, verificar que los equipos de aplicación se encuentren debidamente calibrados.

COMPATIBILIDAD

STRACTA® ORTIGA + HIGUERILLA tiene compatibilidad con la mayoría de los insecticidas y fungicidas. No mezclar con productos que contengan cobre y aguas carbonatadas; realizar una prueba de compatibilidad.

	<i>FICHA TÉCNICA</i>	Revisión: 00 Aprobado: JN Fecha: 28-10-21 Página 2 de 2
		

EFFECTO SOBRE LOS CULTIVOS

STRACTA® ORTIGA + HIGUERILLA no es fitotóxico para los cultivos recomendados si se siguen las recomendaciones dadas en la etiqueta. Aplicar junto con un mojante de calidad, optimiza la aplicación. El producto está recomendado en todo tipo de cultivos.

RECOMENDACIONES DE USO

Aplicar vía foliar, repetir la aplicación a los 7-10 días dependiendo de la presión de la enfermedad.

CULTIVO	MOMENTO DE APLICACIÓN	DOSIS L/CIL	PC (días)	LMR (ppm)
ALCACHOFA ARÁNDANO ARROZ BANANO CAPSICUM CEBOLLA CÍTRICOS ESPARRAGO FRESA GRANADO LEGUMINOSAS MANGO PALTO PAPA PIMIENTO QUINUA VID	Crecimiento vegetativo, floración y cosecha	0.8 - 1.0		No existen restricciones en la aplicación de STRACTA® ORTIGA + HIGUERILLA

*Aplicar a primeras horas de la mañana o al atardecer.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

